



La principal causa de interrupción del embarazo en las mujeres con sobrepeso u obesidad en Pachuca, Hidalgo es la diabetes gestacional, la cual se produce por el incremento de glucosa durante los primeros tres meses de embarazo, informó José Alfredo Castillo Mora, endocrinólogo del Hospital General de Pachuca.

El especialista en tratamiento materno explicó que las mujeres con mayores índices de masa corporal son más susceptibles a presentar una diabetes que puede eliminarse después de la concepción, aunque reaparece en 80 por ciento de los casos antes de los cinco años como mellitus tipo II.

De acuerdo con el trabajador en Salud, en Hidalgo no hay datos reales sobre el número de mujeres que padecen dicha enfermedad, pues el Hospital General de Pachuca campus arista es el único centro que cuenta con una clínica especializada para la atención de mujeres con este padecimiento crónico-degenerativo. “La principal forma de tratamiento de una mujer con diabetes gestacional es la toma de insulina, que se aplica a las pacientes para evitar que el producto sea afectado o pueda presentar la enfermedad”, sostuvo el también cardiólogo del nosocomio.

Una de las principales causas de la aparición de la diabetes gestacional, además de la obesidad, es la edad, pues si una mujer se embaraza después de los 35 años tiene altas probabilidades de padecer la enfermedad.

Según la Secretaría de Salud, en México tres de cada diez mujeres tienen la posibilidad de presentar este padecimiento.

Fuente:

Criterio Hidalgo